

GULLY EXPANSION IN OLIVE ORCHARDS

¹*Institute for Sustainable Agriculture, Spain*

²*University of Cordoba, Spain*

This study focuses on the interaction between vegetation and gully expansion. In many olive orchards, permanent gully channels exist.

Key words: vegetation, gully expansion, olive orchards.

T. Ванваллегем¹, X. В. Гиральдез^{1,2}, X. А. Гомез¹, А. Лагуна², Ф. X. Хименез-Хорнеро²

¹*Институт екологічно раціонального сільського господарства Кордови, Іспанія*

²*Університет Кордови, Іспанія*

РОЗШИРЕННЯ ЯРІВ В ОЛИВКОВИХ САДАХ

Представлені результати дослідження залежності розширення ярів та рослинності. Так, у більшості оливкових садів наявні яри.

Ключові слова: рослинність, розширення ярів, оливкові сади.

T. Ванваллегем¹, X. В. Гиральдез^{1,2}, X. А. Гомез¹, А. Лагуна², Ф. X. Хименез-Хорнеро²

¹*Институт екологічески раціонального сільського господарства Кордови, Іспанія*

²*Університет Кордови, Іспанія*

РАСШИРЕНИЕ ОВРАГОВ В ОЛИВКОВЫХ САДАХ

Представлены результаты исследования зависимости расширения оврагов и растительности. Так, в большинстве оливковых садов овраги присутствуют.

Ключевые слова: растительность, расширение оврагов, оливковые сады.

Gully erosion is now widely recognized as a key process contributing to land degradation, especially in semi-arid areas. However, in spite of numerous studies detailing gully volumes and growth rates, the underlying physical controls are still poorly understood.

This study focuses on the interaction between vegetation and gully expansion. In many olive orchards, permanent gully channels exist. It has been observed that these are often stable in length, but keep expanding in width due to sidewall failures. It is analysed how the location and magnitude of these failures is related to the root pattern of the olive trees. Sidewall failures negatively impact the production of the orchards, since a lot of failures cause trees to fall down the gully channel.

In order to predict the future evolution of the gully systems, a model – as proposed by Roering et al. (2003) – was evaluated. This model relates the tensile force at the failure with the area of the scarp covered by roots. Measurements of gully morphology and root characteristics were made with RTK-GPS in several permanent gullies in the Cordoba province. The position of the individual olive trees was derived from orthophotographs.

Надійшла до редколегії 20.10.09